

Empfehlungen zu Impfintervallen für Hunde der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Stand: Dezember 2018

Die Impfpfehlungen der Medizinischen Kleintierklinik wurden in Anlehnung an verschiedene Leitlinien zur Impfung von Hunden und Katzen (Leitlinien der Ständigen Impfkommision Vet (StIKo) und der World Small Animal Association (WSAVA)) erstellt. Diese Leitlinie stellen Entscheidungshilfen für den anwendenden Tierarzt dar, aus denen sich jeder Tierarzt seine Empfehlungen zusammenstellen kann.

Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥16 Wochen	
CPV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
CDV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
Tollwut	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	nach Herstellerangabe ((1-) 3 Jahre) (laut Tollwut-VO)
Leptospirose	ab 12. Woche 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 12 Monate, möglichst im Frühjahr
Non-Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥16 Wochen	
HCC	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundkontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
Parainfluenza	<u>subkutan</u> : ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr <u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche	<u>subkutan</u> : 1 x, dann nach 1 Jahr <u>intranasal</u> : 1 x	<u>subkutan</u> : bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundkontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) alle 3 Jahre <u>intranasal</u> : bei Bedarf
B. bronchi-septica	<u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche	<u>intranasal</u> : 1 x	<u>intranasal</u> : bei Bedarf
CHV-1		nur bei Zuchthündinnen: während der Läufigkeit oder 7-10 Tage nach dem Decktermin, dann 1-2 Wochen vor der Geburt	nur während der Zucht
Babesiose¹		bei Hunden in endemischen Gebieten oder mit regelmäßigen Aufenthalten im südlichen oder östlichen Ausland: ab 6 Monaten 2 x im Abstand von 3-4 Wochen	alle 12 Monate
Leishmaniose		bei Hunden mit regelmäßigen Aufenthalten im südlichen Ausland: ab 6 Monaten 3 x im Abstand von 3-4 Wochen	alle 12 Monate
Borreliose	nicht empfohlen		
Dermatophytose	nicht empfohlen		

(CPV = canines Parvovirus, CDV = canines Staupevirus, HCC = Hepatitis contagiosa canis, *B. bronchiseptica* = *Bordetella bronchiseptica*, CHV-1 = canines Herpesvirus)

¹Einfuhr über internationale Apotheke