

**Empfehlungen zu Impfintervallen für Katzen der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Stand: März 2018**

Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung
	bei Erstvorstellung < 20 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 20 Wochen	
<b>FPV</b>	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 20. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung, nur bei Fehlen von Antikörpern
<b>FHV-1</b>	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre
<b>FCV</b>	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre
Non-Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung
	bei Erstvorstellung < 20 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 20 Wochen	
<b>Tollwut</b>	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	1 x (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	nach Herstellerangabe ((1 –) 3 Jahre) (laut Tollwut-VO)
<b>FeLV</b>	nur bei Freigängerkatzen nach negativem FeLV-Test: 16. und 20. Woche, dann nach 1 Jahr (frühestens ab 8. Woche möglich)	2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre, nur bis zu einem Alter von 7 Jahren
<b>FIP</b>	nicht empfohlen		
<b><i>Chlamydia felis</i></b>	in Problembeständen: ab 8. Woche, 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: jährlich
<b><i>Bordetella bronchiseptica</i></b>	in Problembeständen: <u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: <u>intranasal</u> : 1 x dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: jährlich
<b>Dermatophytose</b>	nicht empfohlen		

(FPV = felines Parvovirus, FHV-1 = felines Herpesvirus 1, FCV = felines Calicivirus, FeLV = felines Leukämievirus, FIP = feline infektiöse Peritonitis)