

Empfehlungen zu Impfintervallen für Katzen der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Stand: Oktober 2018

Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung
	bei Erstvorstellung < 20 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 20 Wochen	
FPV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 20. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung, nur bei Fehlen von Antikörpern
FHV-1	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre
FCV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	2 x, im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre
Non-Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholungsimpfung
	bei Erstvorstellung < 20 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 20 Wochen	
Tollwut	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	1 x (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	nach Herstellerangabe ((1 –) 3 Jahre) (laut Tollwut-VO)
FeLV	nur bei Freigängerkatzen nach negativem FeLV-Test: 16. und 20. Woche, dann nach 1 Jahr (frühestens ab 8. Woche möglich)	2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre, nur bis zu einem Alter von 7 Jahren
FIP	nicht empfohlen		
<i>Chlamydia felis</i>	in Problembeständen: ab 8. Woche, 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: jährlich
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	in Problembeständen: <u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: <u>intranasal</u> : 1 x dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: jährlich
Dermatophytose	nicht empfohlen		

(FPV = felines Parvovirus, FHV-1 = felines Herpesvirus 1, FCV = felines Calicivirus, FeLV = felines Leukämievirus, FIP = feline infektiöse Peritonitis)