

Empfehlungen zu Impfintervallen für Katzen der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Stand: März 2021

Die Impfeempfehlungen der Medizinischen Kleintierklinik wurden in Anlehnung an verschiedene Leitlinien zur Impfung von Hunden und Katzen (Leitlinien der Ständigen Impfkommision Vet (StiKo), des European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) und der American Association of Feline Practitioners (AAFP)) erstellt. Diese Leitlinie stellen Entscheidungshilfen für den anwendenden Tierarzt dar, aus denen sich jeder Tierarzt seine Empfehlungen zusammenstellen kann.

Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 20 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 20 Wochen	
FPV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 20. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	nach jährlicher Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
FHV-1	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre
FCV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	2 x, im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre
Non-Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 20 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 20 Wochen	
Tollwut*	nur bei Freigängerkatzen oder Auslandsaufenthalt; 1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	nur bei Freigängerkatzen oder Auslandsaufenthalt; 1 x (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	nach Herstellerangabe ((1 →) 3 Jahre) (laut Tollwut-VO), Impfstoffe mit 3-Jahres-Intervall zu empfehlen
FeLV*	nur bei Freigängerkatzen nach negativem FeLV-Test: 16. und 20. Woche, dann nach 1 Jahr (frühestens ab 8. Woche)	2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre, nur bis zu einem Alter von 7 Jahren
FIP	nicht empfohlen		
Chlamydia felis	in Problembeständen: ab 8. Woche, 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: jährlich
Bordetella bronchiseptica	in Problembeständen: <u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche, dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: <u>intranasal</u> : 1 x dann nach 1 Jahr	in Problembeständen: jährlich
Dermatophytose	nicht empfohlen		

(FPV = felines Panleukopenievirus, FHV-1 = felines Herpesvirus 1, FCV = felines Calicivirus, FeLV = felines Leukämievirus, FIP = feline infektiöse Peritonitis)

* nur Adjuvantien-freie Impfstoffe