

## Empfehlungen zu Impfintervallen für Hunde der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Stand: Juni 2022

Die Impfeempfehlungen der Medizinischen Kleintierklinik wurden in Anlehnung an verschiedene Leitlinien zur Impfung von Hunden und Katzen (Leitlinien der Ständigen Impfkommision Vet (StIKo) und der World Small Animal Association (WSAVA)) erstellt. Diese Leitlinie stellen Entscheidungshilfen für den anwendenden Tierarzt dar, aus denen sich jeder Tierarzt seine Empfehlungen zusammenstellen kann.

Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 16 Wochen	
CPV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	nach jährlicher Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
CDV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	nach jährlicher Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
Leptospirose (tetravalenter Impfstoff)	ab 12. Woche* 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 12 Monate, möglichst im Frühjahr
Non-Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥ 16 Wochen	
Tollwut	1 x ab 12. Woche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	1 x ab 12. Woche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	nach Herstellerangabe ((1-) 3 Jahre) (laut Tollwut-VO), Impfstoffe mit 3-Jahres-Intervall zu empfehlen
HCC	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundekontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
Parainfluenza	<u>subkutan</u> : ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr <u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche	<u>subkutan</u> : 1 x, dann nach 1 Jahr <u>intranasal</u> : 1 x	<u>subkutan</u> : bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundekontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) alle 3 Jahre <u>intranasal</u> : bei Bedarf alle 12 Monate
<i>B. bronchi-septica</i>	<u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche	<u>intranasal</u> : 1 x	<u>intranasal</u> : bei Bedarf alle 12 Monate
CHV-1		nur bei Zuchthündinnen: während der Läufigkeit oder 7-10 Tage nach dem Decktermin, dann 1-2 Wochen vor der Geburt	nur während der Zucht
Babesiose <sup>1</sup>		nur bei Hunden in endemischen Gebieten oder mit regelmäßigen Aufenthalten im südlichen oder östlichen Ausland: ab 6 Monaten 2 x im Abstand von 3-4 Wochen	alle 12 Monate
Leishmaniose		nur bei Hunden mit	alle 12 Monate

		regelmäßigen Aufenthalt im südlichen Ausland und nach negativem Leishmanien-Antikörper- Test: ab 6 Monaten nach Herstellerangabe	
<b>Borreliose</b>			nicht empfohlen
<b>Dermato- phytose</b>			nicht empfohlen

(CPV = canines Parvovirus, CDV = canines Staupevirus, HCC = Hepatitis contagiosa canis, *B. bronchiseptica* = *Bordetella bronchiseptica*, CHV-1 = canines Herpesvirus)

\*Je nach epidemiologischer Situation: bei hohem Infektionsdruck, intensivem Kontakt zu Wasser oder Nagetieren  
Impfung bereits ab der 8. Woche

<sup>1</sup>Einfuhr über internationale Apotheke